



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-560,
E-mail: mail@meria.sumy.ua

20.09.18 № 539/03.08.08-16 на _____ від _____

Відюку І.С.
vanya-vidyuk@yandex.ru

Шановний Іване Сергійовичу!

З приводу Вашої петиції «Закупить нормальные (без побочных реакций) вакцины для детей» повідомляємо наступне.

Питання, зазначене у Вашій петиції, було розглянуто на черговому засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради. Виконавчий комітет Сумської міської ради своїм рішенням від 14.08.2018 №463 «Про розгляд електронної петиції Відюка І.С. «Закупить нормальне (без побочных реакций) вакцины для детей» вирішив не підтримати Вашу петицію.

Інформуємо, що на сьогоднішній день вакцинація дітей в Україні здійснюється згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11.08.2014 року № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Відповідно до цього наказу в Україні обов'язково проводиться вакцинація проти туберкульозу, гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» вакцини закуповуються за допомогою міжнародних організацій. Вакцини, що входять до календаря щеплень, за угодою з Міністерством охорони здоров'я України за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Усі вакцини безпечні, ефективні та якісні, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я – найавторитетнішою організацією у сфері охорони здоров'я у світі, що підтверджено низкою сертифікатів.

Міністерство охорони здоров'я України передає закуплені вакцини департаментам охорони здоров'я областей. Отримані від управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації вакцини через КУ «СОДКЛ» розподіляються в закладах рівномірно відносно плану щеплень. Вакцини розраховані на категорії населення, яким потрібно зробити щеплення відповідно до календаря щеплень.

У світі існує два типи комбінованих вакцин, які містять проти кашлюковий компонент: цільноклітинні та ацелюлярні. Один тип містить цілі убиті клітини

збудника кашлюку і тому називається вакциною з цільноклітинним кашлюковим компонентом (АКДП), а другий містить безклітинний, або ацелюлярний кашлюковий компонент (АКаДП). Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця. В Україні існує досвід застосування обох типів вакцин.

Міністерство охорони здоров'я України не закуповує комбінованих вакцин, до складу яких входить вакцина з ацелюлярним кашлюковим компонентом - Пентаксим, Інфанрікс, Інфанрікс ІПВ, Інфанрікс Гекса починаючи з 2017 року. З квітня 2017 року вакцинація дітей раннього віку проводиться тільки вакциною АКДП (виробник Індія). Ця вакцина цільноклітинна та допущена до застосування, дає стійкий імунітет до таких небезпечних захворювань, як коклюш, дифтерія і правець.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на підставі аналізу багаторічного досвіду застосування у світі вакцин з цільноклітинним та ацелюлярним компонентом кашлюковим компонентом з'ясовано, що вони можуть спричинити після проведення щеплень місцеві та загальні реакції, що зазвичай виникають протягом першої доби після щеплення. Загальні реакції проявляються підвищенням температури тіла, дратівливістю, збудженням. Місцеві реакції виражені болем, почервонінням, набряком та ущільненням. При застосуванні вакцини з цільноклітинним кашлюковим компонентом тимчасові розлади стану здоров'я дітей виникають частіше та мають більш виражений характер. Вони тривають у переважній більшості випадків не довше 72 годин, минають самі по собі, інколи потребують для зменшення вираженості симптомів застосування жарознижувальних препаратів. Певною мірою загальні реакції свідчать про наявність реагування імунної системи щепленої дитини на введення вакцини, що у подальшому супроводжується утворенням в організмі захисту проти інфекцій та формуванням стійкого імунітету. Є й чимало таких малюків, які переносять вакцинацію абсолютно безболісно. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я після щеплення вакцинами з цільноклітинним кашлюковим компонентом виробляється значно стійкий та більший імунітет, оскільки вони є більш імуногенні.

Охоплення вакцинацією на рівні 95 % населення країни дозволяє забезпечити повноцінний захист населення від спалахів та епідемій інфекційних хвороб, які можна запобігти щепленнями – це називається колективний імунітет. Якщо рівень охоплення населення країни щепленнями падає на кілька процентів, це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб. Що нижчий колективний імунітет, то вище шанс виникнення спалахів та епідемій. Останнім часом рівень колективного імунітету в Україні знизився до критичного значення. За таких умов застосування вакцин з цільноклітинним кашлюковим компонентом більш якісно захищає населення від інфекційних хвороб та пов'язаних з ними ускладнень.

Міський голова

Чумаченко 650 553



О.М. Лисенко